



PrevicoxTM
(firocoxib)
Comprimidos Mastigáveis

053 912242

Zone
de colle

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA: Cada comprimido de PREVICOXTM contém

Nome dos Ingredientes	% m/m	Quantidade (mg/comprimido)	
		Comprimido de 57 mg	Comprimido de 227 mg
Firocoxib	24,0	57	227
Excipiente q.s.p.	76,0	180	720

INDICAÇÕES

Antiinflamatório não esteróide (AINE) para alívio da dor e inflamação associadas à osteoartrite e manejo da dor e inflamação perioperatória associada à cirurgia de tecidos moles dos cães.
5 mg por kg de peso corporal, uma vez ao dia.

VIAS E MODO DE ADMINISTRAÇÃO

Administrar por via oral de acordo com a seguinte tabela:

Peso corporal (kg)	Número de Comprimidos por administração	
	57 mg	227 mg
Até 3 kg	¼	
3 – 5,5	½	
5,6 – 10	1	
10,1 – 15	1 ½	
15,1 – 22		½
22,1 – 45		1
45,1 – 68		1 ½
68,1 – 90		2

AVISO SOBRE A CORRETA FORMA DE ADMINISTRAÇÃO

Os comprimidos podem ser administrados sozinhos ou misturados com algum alimento.

A duração do tratamento varia segundo a resposta clínica.

Um tratamento de longa duração deve ser administrado sob controle veterinário constante.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não usar em cadelas durante as fases de gestação e lactação.

EFEITOS BIOLÓGICOS NÃO DESEJADOS

Foram descritos casos raros de vômitos, geralmente transitórios e reversíveis com a interrupção do tratamento.

O médico veterinário deve ser informado sobre o aparecimento de efeitos adversos durante o tratamento.

ARMAZENAMENTO

Mantenha fora do alcance das crianças.
Conservar entre 15° e 30° C

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Não ultrapassar a dose recomendada em animais com menos de 12 semanas de idade.

Caso sejam observados efeitos adversos não desejados (diminuição do apetite ou emagrecimento), recomenda-se interromper o tratamento e comunicar ao Médico Veterinário.

PREVICOXTM não foi testado em cães com insuficiência hepática ou renal significativa. A utilização do produto nestes animais deve ser feita sob orientação do Médico Veterinário.

O tratamento prévio com substâncias antiinflamatórias pode provocar o aparecimento ou piora dos efeitos adversos. Recomenda-se, portanto, um período mínimo de 24 horas sem administração de outro medicamento antes de começar o tratamento com PREVICOXTM. A duração deste período de transição deve ser adaptada em função das propriedades farmacocinéticas dos produtos utilizados anteriormente.

PREVICOXTM não deve ser administrado simultaneamente com outros AINE ou glicocorticóides.

O uso de corticosteróides em pacientes tratados com antiinflamatórios não esteróides pode provocar um agravamento das ulcerações do trato gastrointestinal.

No caso de ingestão acidental por humanos, consulte imediatamente um médico e leve a bula.

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREVICOXTM Comprimidos Mastigáveis são comprimidos divisíveis, para garantir uma dose precisa e, com sabor defumado e caramelo, para torná-los mais atraentes para o cão facilitando assim sua administração.

Modo de ação:

Firocoxib é um antiinflamatório não esteróide (AINE) inibidor da ciclooxigenase (Coxib), com excelentes atividades antiinflamatória, analgésica e antipirética em animais. Administrado a uma dose terapêutica diária, o firocoxib não inibe a isoenzima COX-1, responsável pela manutenção das funções fisiológicas normais, mas bloqueia a biosíntese das prostaglandinas por meio da inibição da isoenzima indutora da ciclooxigenase (COX-2) responsável pela síntese dos mediadores inflamatórios. Nos exames de sangue total de cães, o firocoxib mostrou uma seletividade aproximadamente 380 vezes maior para COX-2 do que para a COX-1.

Para obter mais informações sobre este produto, ligue para 0800 888 7387

VENDA SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Apresentação: caixas com 10, 30 ou 180 comprimidos mastigáveis com 57 mg ou 227 mg, ou frascos de 60 comprimidos de 57 mg ou 227 mg.

Validade do Produto: 2 (dois) anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob Nº 9156 em 10/10/2005.
Resp. Técnica: Dra. Patricia Schwarz CRMV-SP Nº 21.530

Proprietário e fabricante: Merial France

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor: Merial Saúde Animal Ltda. Fazenda São Francisco – Paulínia. CNPJ: 57.600.249/0001-55

PRODUTO IMPORTADO

Informações para proprietários de cães tratados com PrevicoxTM
Este sumário contém informações importantes sobre PrevicoxTM, você deve lê-las atentamente antes de iniciar o tratamento de seu cão. Estas informações são complementares e não substituem as informações fornecidas pelo seu Médico Veterinário de confiança.

O que é PrevicoxTM?

PrevicoxTM é um antiinflamatório não esteróide indicado para controle da dor e inflamação causada pela osteoartrite em cães. A osteoartrite é uma doença inflamatória dolorosa causada pelo "desgaste" das articulações. Os sintomas mais comuns associados a esta doença são:

- Claudicação (manqueira).
- Diminuição da atividade motora (relutância a se movimentar)
- Perda da mobilidade articular

Que tipo de resposta devo esperar de meu animal tratado com PrevicoxTM?

PrevicoxTM é um medicamento auxiliar no tratamento da osteoartrite canina, proporcionando alívio dos sintomas e melhora clínica dos animais tratados.

- A melhora clínica varia de animal para animal, mas a diminuição dos sintomas pode ser excelente após a administração de PrevicoxTM
- Na maioria dos cães a melhora clínica pode ser observada em poucos dias após o tratamento

Quais cães NÃO devem receber PrevicoxTM?

- Animais sabidamente alérgicos ao composto químico ativo do produto (firocoxib)

- Animais que estejam recebendo outros antiinflamatórios (esteróides ou não)
- Cadelas gestantes ou que estejam amamentando seus filhotes

PrevicoxTM deve ser administrado apenas a cães
Este medicamento é específico para cães e não deve ser administrado a pessoas. Em caso de ingestão acidental do produto, procure seu Médico.

O que você deve dizer/perguntar ao seu Veterinário antes de administrar PrevicoxTM ao seu cão?
Converse com seu Veterinário sobre:

- Os sintomas de osteoartrite observados em seu cão (claudicação e dificuldade de locomoção)
- A importância do controle do peso no tratamento da osteoartrite canina
- Quais exames podem ser realizados antes que PrevicoxTM seja administrado ao seu animal
- Com que frequência seu cão deverá ser examinado enquanto estiver recebendo PrevicoxTM
- Medicamentos que seu animal já esteja tomando ou que você pretenda administrar enquanto ele estiver recebendo PrevicoxTM
- Se seu animal está gestante, amamentando ou se você planeja colocá-lo em reprodução durante o tratamento com PrevicoxTM

Diga ao seu Veterinário se seu cão já apresentou os seguintes problemas:

- Qualquer sintoma adverso após a administração de PrevicoxTM ou outro antiinflamatório qualquer
- Distúrbios gastrointestinais (vômito ou diarreia) que seu animal tenha apresentado com frequência
- Doenças renais
- Doenças hepáticas
- Converse com ele sobre os medicamentos que já causaram algum tipo de reação adversa ou alérgica ao seu cão

Quais são os efeitos adversos que podem ocorrer durante a administração de PrevicoxTM ao seu cão?

- Devido ao seu mecanismo de ação (alta seletividade pela enzima COX-2) PrevicoxTM é um antiinflamatório extremamente seguro quando administrado na dose recomendada. No entanto, efeitos adversos podem ocorrer como na utilização de qualquer antiinflamatório, podendo-se observar: vômito, diarreia, fezes escurecidas, prostração e diminuição da ingestão dos alimentos. Caso algum destes sintomas seja observado, recomenda-se interromper o tratamento e consultar imediatamente o Médico Veterinário.

O que devo fazer caso meu cão ingira acidentalmente uma maior dose de PrevicoxTM?

- Caso seu cão ingira mais comprimidos do que fora recomendado, avise seu Médico Veterinário.



MERIAL GRAPHIC ARTWORK APPROVAL

Code: 0 053 912242	VERSION	COLORS
PRODUCT: NOT PIL PREVICOX	INITIALS: VA - COMPOSER ET/RH	Noir/Black
COUNTRY: Brésil (BR)	VERSION - DATE: A 26/10/15 15h00 B 17/12/15 15h00	
Dimensions (mm): 228x276	CANCEL AND REPLACE:	Please use the official PANTONE® (P) matching system for an accurate color representation.
PRINTED BASIS CODE (if applicable): NA	0 053 907394	

Marketing approval:	Regulatory approval:
COMPLETE NAME:	COMPLETE NAME:
DATE + SIGNATURE:	DATE + SIGNATURE: