

150907-04

RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L

Vacina contra Cinomose,
Hepatite, Adenovírus Tipo 2,
Parainfluenza, Parvovirose,
Coronavirose e Leptospirose.

Uso Veterinário



Informações técnicas

A RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L é uma vacina liofilizada. A fração Cinomose é um vírus vivo modificado, purificado e atenuado por cultivo em linhagem celular (cepa Onderstepoort). A fração Adenovírus Tipo 2 é um vírus vivo modificado, purificado e atenuado por cultivo em linhagem celular, que confere proteção contra Doença Respiratória causada por Adenovírus Tipo 2 e proteção cruzada contra Hepatite Infeciosa Canina causada por Adenovírus Canino Tipo 1. A fração Coronavírus Canino é composta de vírus morto, purificado, cultivado em linhagem celular. A produção de um antígeno inativado eficaz, seguro e com grande poder antigênico é possibilitada por técnicas especiais de preparação e pelo uso de um sistema adjuvante especial. A fração Parainfluenza Canina é um vírus vivo modificado, purificado e atenuado por cultivo em linhagem celular. A fração Parvovírus Canino da vacina é preparada a partir de um vírus de campo atual, o CPV 2b, que foi isolado, modificado e atenuado através de baixas passagens em cultivo celular. O vírus vacinal foi purificado e modificado para proporcionar segurança, conservando suas características de antigenicidade e eficácia.

As frações *Leptospira* das vacinas são preparadas a partir de componentes de membrana externa através da tecnologia de sub-unidade O.M.C. (Outer Membrane Complex), usada para extrair os antígenos altamente imunogênicos das células da *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira grippityphosa* e *Leptospira pomona*.

Indicação

A RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L é recomendada para a vacinação de cães saudáveis com 6 semanas de idade ou mais, como auxiliar na prevenção contra Cinomose, Hepatite Infeciosa Canina, Adenovírus Canino Tipo 2, Coronavírus Canino, Parainfluenza Canina, Parvovírus Canino, e Leptospirose causada pelas cepas *Leptospira canicola*, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira grippityphosa* e *Leptospira pomona*.

Posologia, administração e modo de usar

Seguindo as normas usuais de anti-sepsia, reidratar a fração liofilizada com a fração líquida, misturando o conteúdo dos dois frascos que compõem a embalagem. Administrar uma dose de 1 mL por via subcutânea. **Agitar bem antes de usar.**

Esquema de vacinação

- Primovacinação: Iniciar em torno de 6 semanas de idade. Sabe-se que a presença de anticorpos maternos interfere no desenvolvimento da imunidade ativa. Por isso, os filhotes devem ser revacinados a cada 2 ou 3 semanas até, no mínimo, 12 semanas de idade. Cães com idade acima de 12 semanas deverão receber 2 doses da RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L com intervalo de 2 ou 3 semanas entre elas.
- Vacinação anual: recomenda-se a revacinação anual com uma dose de RECOMBITEK® Max 5 CvK/4L.

Contraindicações e precauções

- Apenas animais saudáveis devem ser vacinados. Caso o animal esteja incubando a doença no momento da vacinação, a eficácia da vacina pode ser prejudicada.
- A vacinação de animais enfermos, subnutridos, com alta carga parasitária ou sob condições de estresse, poderá comprometer o estabelecimento de uma imunidade sólida.
- O uso concomitante com substâncias antimicrobianas ou anti-inflamatórias poderá interferir com o desenvolvimento e a manutenção da resposta imune após a vacinação.
- O processo de vacinação deverá ser precedido de um minucioso exame clínico, realizado por um médico-veterinário.
- Usar todo o conteúdo imediatamente após a reconstituição.

- Contém gentamicina e timerosal como preservantes.
- Observar sempre as legislações estaduais e municipais para descarte deste produto.
- Manter este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Reações adversas

Em casos raros de reação anafilática, administrar epinefrina.

Apresentação

Caixa contendo 25 frascos com vacinas liofilizadas contra Cinomose, Doenças Respiratórias causadas por Adenovírus Tipo 2, Parainfluenza e Parvovirose, acompanhados de 25 frascos de 1 mL de vacinas líquidas contra Coronavirose e Leptospirose (*Leptospira canicola*, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira grippityphosa* e *Leptospira pomona*).

Observações

A resposta adequada à vacinação é diretamente ligada à competência imunológica de cada animal. Siga corretamente o modo de usar.

Condições de conservação

Conservar em temperatura entre 2°C e 8°C, ao abrigo da luz. Evitar congelamento. Manter este ou qualquer outro medicamento fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do médico-veterinário.

RECOMBITEK® é uma marca registrada da Merial, usada licença.

Proprietário

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
St. Joseph, Missouri 64506 USA
US Vet. Lic. No. 124

Fabricante

Elanco US Inc.
800 Fifth St. NW
Ft. Dodge, Iowa 50501 USA

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco s/n - Paulínia - SP
CNPJ: 57.600.249/0001-55
Resp. Téc.: Simone B. Zampieri
CRMV-SP 19.996
SAC.: 0800 888 7387

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 8449, em 23/01/03.

Produto importado.

Orientações para retirada do rótulo.

