

090341060/0

Vetmedin®Boehringer
Ingelheim

Comprimidos Mastigáveis - Pimobendan para cães - 1.25 mg

Comprimidos Mastigáveis - Pimobendan para cães - 2.5 mg

Comprimidos Mastigáveis - Pimobendan para cães - 5 mg

Composição:**Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis para cães 1.25 mg - Pimobendan 1.25 mg****Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis para cães 2.5 mg - Pimobendan 2.5 mg****Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis para cães 5 mg - Pimobendan 5 mg****Indicações: Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis** é indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, originária de insuficiência valvar (regurgitação das válvulas mitral e/ou tricúspide) ou cardiomiopatia dilatada.**Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis** também é indicado para o tratamento de cardiomiopatia dilatada no estágio pré-clínico (assintomático com um aumento no diâmetro final do ventrículo esquerdo sistólico e diastólico) no Doberman Pinscher, após o diagnóstico ecocardiográfico de doença cardíaca.**A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.****Posologia, via de administração e modo de usar:** administração oral.

A dosagem é de 0,5 mg de pimobendan/kg de peso corporal, divididos em duas doses diárias.

Isto corresponde a:

Um comprimido mastigável de 1,25 mg pela manhã e um comprimido mastigável de 1,25 mg à noite para um peso corporal de 5 kg.

Um comprimido mastigável de 2,5 mg pela manhã e um comprimido mastigável de 2,5 mg à noite para um peso corporal de 10 kg.

Um comprimido mastigável de 5 mg pela manhã e um comprimido mastigável de 5 mg à noite para um peso corporal de 20 kg.

Não exceder a dose recomendada.

Determinar precisamente o peso corporal antes do tratamento para assegurar a dosagem correta.

A dose deve ser mantida dentro do intervalo de dose de 0,2 mg a 0,6 mg de pimobendan/kg de peso corporal divididas em duas doses diárias.

A dose de **Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis** deve ser administrada cerca de uma hora antes da alimentação.**Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis** também pode ser usado em combinação com um diurético, i.e. furosemida.No caso de insuficiência cardíaca congestiva, o tratamento contínuo ao longo da vida com **Vetmedin® Comprimidos Mastigáveis** é recomendado. A dose de manutenção nestes casos deve ser ajustada individualmente, de acordo com a severidade da enfermidade.

Os comprimidos mastigáveis podem ser partidos pela metade na linha sulcada, para precisão de dosagem de acordo com o peso corporal.

Contraindicações, precauções e reações adversas:

Interação com outros produtos farmacêuticos e outras formas de interação: em estudos farmacológicos, não foi detectada nenhuma interação entre o glicosídeo cardíaco ouabaína e o pimobendan. O aumento na contratilidade cardíaca induzido pelo pimobendan é atenuado na presença do antagonista do cálcio verapamil e do β -antagonista propranolol.

Precauções especiais para uso em animais: a glicose no sangue deve ser monitorada regularmente durante o tratamento em cães com diabetes mellitus. Para uso no “estágio pré-clínico” (assintomático com um aumento no diâmetro final do ventrículo esquerdo sistólico e diastólico), deve ser feito o diagnóstico através de um exame cardíaco global (incluindo exame ecocardiográfico e possivelmente monitoramento por Holter). Variações cardíacas específicas das raças (i.e. diâmetro ventricular esquerdo (LDV) na sístole e na diástole) devem ser levadas em conta. Monitoramento da função e morfologia cardíaca é recomendado em animais tratados com pimobendan.

Uso durante a prenhez, lactação ou parto: em estudos com ratos e coelhos, o pimobendan não mostrou efeito na fertilidade.

Efeitos embriotóxicos somente ocorreram em doses maternotóxicas. Em experimentos com ratos, foi demonstrado que o pimobendan é excretado no leite. A segurança do produto não foi avaliada em cadelas prenhes ou lactantes. Usar somente de acordo com a avaliação risco/benefício pelo veterinário responsável.

Não exceder a dose recomendada.

Em caso de superdosagem, deve ser iniciado o tratamento sintomático.

O produto não foi testado em casos de cardiomiopatia dilatada assintomática em Dobermans com fibrilação atrial ou taquicardia ventricular sustentada.

No caso de ingestão acidental, buscar auxílio médico imediatamente e mostrar a bula ou o rótulo do produto ao médico.

Lavar as mãos após o uso.

Aviso aos médicos: ingestão acidental, especialmente por uma criança, pode levar à ocorrência de taquicardia, hipotensão ortostática, rubor da face e dores de cabeça.

Apresentação: frascos contendo 50 comprimidos, embalados em cartuchos e acompanhados de bula.

Prazo de validade:

Prazo de validade do produto embalado para venda: 36 meses. Lote, data de fabricação e data de validade: vide rótulo.

Venda sob prescrição e uso sob orientação do Médico Veterinário.

Armazenar o produto entre 15°C e 30°C. Armazenar na embalagem original bem fechada para proteger da umidade, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar.

Manter longe do alcance de crianças e animais domésticos.

Fabricante: Boehringer Ingelheim Promeco S.A. de C.V.

Calle Maiz 49, Bairro Xaltocan

Del. Xochimilco C. P. 16090, Mexico, D. F., Mexico

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, Km 286 - Itapecerica da Serra - SP - CEP 06888-700

CNPJ: 60.831.658/0021-10

Responsável Técnica: Médica Veterinária Simone R. V. Farah - CRMV-SP 10.783.

Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sob o nº 00008798/2015 em 06/02/2017.

Produto importado.

SAC: 0800 888 5870